

Avertissements agricoles

Publication périodique

ÉDITION "GRANDES CULTURES"

ISSN 0757 4029

BULLETIN TECHNIQUE N° 9

3 MAI 1984

MAIS

DÉSHÉRBAGE APRES LA LEVÉE : RECOURS PARFOIS INDISPENSABLE

● PRESENCE DE DICOTYLEDONES RESISTANTES :

→ Complément nécessaire à un traitement de prélevée.

SPECIALITE DOSES/HA	STADE MAIS	ADVENTICES		RESISTANTES	
		MORELLE	CHENOPODE	AMARANTHES	RENOUEES
DICOPRIME 2 l	15-30 cm	4-5 f	4-5 f	-----	2-3 f
HERBOGIL liq. 3 l	2-6 f	4-5 f	4-5 f	-----	2-3 f
NIXONE liq. 3 l					
LENTAGRAN 2 kg	4-6 f	4-10 f	4-10 f	4-10 f	-----
PYRON 1,5 l	4-6 f	4-5 f	4-5 f	4-10 f	-----
LADDOK 4 l	postlevée	4-5 f	4-5 f	4-5 f	4 f

Source AGPM

● PRESENCE DE GRAMINEES ESTIVALES mal contrôlées en désherbage de prélevée (panics, sétaires, digitaires) :

- levée à 5 feuilles du maïs :

→ traitement en plein avec ATRAZINE 4 l + Huile 5 l.

- 40 cm à 50 cm maïs :

→ traitement en dirigé avec :

. Paraquat 3 l

. Ametryne + Huile (2,5 l + 5 l)

. Terbutryne + Huile (4 l + 5 l)

Cette solution est le seul recours dans le cas de GRAMINEES RESISTANTES.

Abonnement annuel : 95 F - Chèque à l'ordre du Régisseur de Recettes D.D.A. Loiret à envoyer à l'adresse ci-dessous.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, Rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX - Tél. (38) 86.36.24

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

Imprimerie de la Station "Centre"

Le Directeur-Gérant : A. SIMONIN

CPPAP N° 530 AD



P 16

● PRESENCE DE VIVACES.

MATIERE ACTIVE	PRODUIT COMMERCIAL	DATE D'APPLICATION ET DOSE	ADVENTICES
ATRAZINE + huile	NOMBREUX	4 l + 5 l huile - levée à 5 feuilles du maïs	Chiendent rampant
3,6 D.C.P.	LONTREL SF 100	1,5 l post-levée des adventices	Dicotylédones vivaces
2,4,5. T.P.	DIVERS	0,75 à 1 l de m. a. - traitement dirigé entre 40 et 50 cm maïs	Ronces Gesse
2,4,5. T.P.	DIVERS	0,75 à 1,2 l de m. a. - traitement dirigé entre 40 et 50 cm maïs	Prêle Renouée amphibie
2,4,5. D. Sels d'amine	DIVERS	0,3 l de m. a. au stade 5 f maïs 0,75 à 1 l de m. a. selon température en traitement dirigé 50 cm maïs	Liserons Liserons Chardons

Attention : au cumul de dose d'Atrazine en pré et post-levée pour les risques de rémanence sur la culture suivante.

COLZA

CHUTE DES PETALES : RISQUES DE CONTAMINATIONS PAR LE SCLEROTINIA

Voir le bulletin N° 8.

CHARANCON DES SILIQUES : MAINTENEZ LA SURVEILLANCE

PUCERON CENDRE :

- Des débuts d'attaques ont été observées en Indre et Loire et dans le Loiret :
- Intervenez si vous observez 2 colonies par m².

DES ECLATEMENTS DE TIGES sont observés un peu partout dans la région :

Ces éclatements sont dûs soit :

- au charançon de la tige, dont on voit les larves, dans les parcelles qui n'ont pas eu de traitement à temps,
- à une croissance trop rapide, mais dans ce cas la tige est parfaitement saine. Ces éclatements ne sont pas inquiétants.

